

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Председателя Комитета  
медицинской и фармацевтической  
деятельности  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан  
от «18» июня 2014 года  
№ 427

**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства**

**БРОНХОСТОП® Сироп**

**Торговое название**  
Бронхостоп® Сироп

**Международное непатентованное название**  
Нет

**Лекарственная форма**  
Сироп 120 мл

**Состав**

1 мл сиропа содержит

*активные вещества:*

тимьяна травы экстракт сухой 8.0 мг,

алтея корня экстракт жидкий 55.3 мг,

*вспомогательные вещества:* мальтодекстрин, акация, сок малины, ксилит, ксантановая камедь, кислоты лимонной моногидрат, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), ароматизатор малиновый, вода очищенная.

В процессе производства тимьяна травы экстракта сухого (соотношение сырья к экстрагенту 7 – 13 : 1), алтея корня экстракта жидкого (соотношение сырья к экстрагенту 1 : 12 – 14) в качестве экстрагента используется вода.

**Описание**

Вязкая, коричневая жидкость с характерным запахом (тимьяна).

**Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для устранения симптомов простуды и кашля.

Отхаркивающие препараты.

Комбинация отхаркивающих препаратов.

Код АТХ R05CA10

## **Фармакологические свойства**

### **Фармакокинетика**

Не требуется.

### **Фармакодинамика**

Тимьян обладает секретолитическим, отхаркивающим и бронхолитическим свойствами и облегчает отхаркивание вязкой мокроты. Эфирное масло, которое также содержится в экстракте травы тимьяна, обладает антисептическими свойствами.

Полисахариды, входящие в состав корня алтея, уменьшают раздражение слизистых оболочек путем формирования защитного слоя. Это усиливает барьер против раздражителей и уменьшает чувствительность кашлевых рецепторов, снижая позыв к кашлю.

## **Показания к применению**

- для уменьшения раздражения глотки и в качестве отхаркивающего средства при кашле, связанном с простудными заболеваниями верхних дыхательных путей.

## **Способ применения и дозы**

Для приема внутрь, в неразбавленном виде.

Если требуется, препарат Бронхостоп® Сироп можно разбавить водой или теплым чаем.

Взрослым и детям старше 12 лет: 15 мл каждые 3-4 часа (4 – 6 раз в сутки; максимальная суточная доза до 90 мл).

Детям от 4 до 12 лет: 7,5 мл каждые 3-4 часа (4 – 6 раз в сутки; максимальная суточная доза до 45 мл).

Дети от 2 до 4 лет: после консультации с врачом можно применять по 7,5 мл каждые 3-4 часа (4 – 6 раз в сутки; максимальная доза до 45 мл).

Дети до 2 лет: применение у детей в возрасте до 2 лет не рекомендуется.

Длительность лечения препаратом Бронхостоп® Сироп не должна превышать 5 дней. Если в течение 5 дней улучшения состояния не происходит, необходимо обратиться к врачу.

## **Побочные действия**

- реакции гиперчувствительности (включая один случай анафилактического шока и один случай отека Квинке)
- расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

## **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к активным веществам, другим растениям семейства Губоцветных (Lamiaceae) или к любому из вспомогательных веществ
- детский возраст до 2 лет
- наследственная непереносимость фруктозы.

## **Лекарственные взаимодействия**

Исследования лекарственных взаимодействий не проводились.

## **Особые указания**

При появлении одышки, лихорадки, гнойных выделений и/или побочных эффектов необходимо обратиться к врачу.

Бронхостоп<sup>®</sup> Сироп содержит консерванты метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат. Они могут вызвать развитие реакций гиперчувствительности, включая реакции замедленного типа.

Из-за отсутствия достаточных данных, применение у детей в возрасте до 2 лет не рекомендуется.

*Период беременности и кормления грудью.*

В связи с отсутствием достаточных данных прием во время беременности и кормления грудью не рекомендован.

*Влияние на способность управлять автотранспортом или работу с механизмами.*

Исследования в отношении воздействия на способность управлять транспортным средством и работать с механизмами не проводились.

## **Передозировка**

*Симптомы:* усиление побочных эффектов.

*Лечение:* отмена препарата, при необходимости - симптоматическое лечение.

## **Форма выпуска и упаковка**

По 120 мл препарата во флаконе из коричневого стекла с насадкой и навинчивающимся колпачком из полиэтилена и кольцом с защитой от вскрытия.

По 1 флакону вместе с полипропиленовым мерным стаканчиком со шкалой от 2,5 до 20 мл и инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства на государственном и русском языках в картонной коробке.

## **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

## **Срок хранения**

3 года

Период применения после вскрытия флакона 4 недели.

Не использовать после истечения срока годности.

## **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

**Производитель**

Квизда Фарма ГмбХ,  
Эффингергассе 21, 1160 Вена, Австрия

**Владелец регистрационного удостоверения**

Квизда Фарма ГмбХ,  
Эффингергассе 21, 1160 Вена, Австрия

*Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара):*

Представительство Дельта Медикел Промоушнз АГ (Швейцария)  
050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, д. 280  
Тел./факс +7 (727) 332 20 79  
Электронная почта: [PVG@deltamedical.com.ua](mailto:PVG@deltamedical.com.ua)